

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ КОЈА ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ПОВРЕДЕ

(1) Сходно члану 1, став 3. Посебних услова за колективно додатно здравствено осигурање за случај здравствене неспособности која је последица повреде, ова Табела се примењује за одређивање процента трајне здравствене неспособности која је последица повреде (у даљем тексту: Табела), и саставни је део Посебних услова и уговора о колективном осигурању за случај здравствене неспособности које је последица повреде

(2) У осигурању лица за случај здравствене неспособности које је последица повреде код одређивања процента трајне здравствене неспособности примењује се искључиво проценат одређен овом Табелом.

(3) Приликом примене одређених тачака из Табеле за једну последицу, примењује се на истим органима или екстремитетима она тачка која одређује највећи проценат, односно није дозвољена примена две тачке за исто функционално оштећење, односно последицу.

(4) Ако је дефиницијом здравствене неспособности израженом кроз одређену тачку Табеле предвиђено да постоји више степена оштећења (разграничених ознакама а, б, в, г), искључиво је право лекара цензора осигураваача да процени степен здравствене неспособности у оквиру дефинисане тачке.

(5) Ако је дефиницијом здравствене неспособности израженом кроз одређену тачку Табеле предвиђен проценат неспособности у одређеном распону, искључиво је право лекара цензора осигураваача да утврди овај проценат према стручној процени у оквиру дефинисаног распона.

(6) Субјективне тегобе у смислу смањења моторне мишићне снаге, болова и отока на месту повреде не узимају се у обзир при одређивању процента трајне здравствене неспособности. Индивидуалне способности, социјални положај или занимање (професионална способност) осигураника не узимају се у обзир при одређивању процента здравствене неспособности.

Уводна одредба

Субјективне тешкоће у смислу смањења моторне мишићне снаге, болова и отока на месту

повреде не узимају се у обзир при одређивању процента здравствене неспособности.

I ГЛАВА

1. Дифузне повреде мозга са клинички утврђеном сликом:

- декортизација односно децеребрација;
- хемиплегија инветерираног типа са афазијом и агнозијом;
- деменција (Корсаковљев синдром);
- обострани Паркинсонов синдром са израженим ригором;
- комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија;
- епилепсија са деменцијом и психичком детериорацијом;
- психоза100 %

2. Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом:

- хемипареза са јако израженим спастицитетом;
- екстрапирамидална симптоматологија (немогућност координације покрета или постојање грубих нехотичних покрета);
- псеудобулбарна парализа са присилним плачем или смехом;
- оштећење малог мозга са израженим поремећајима равнотеже хода и координације покрета90 %

3. Псеудобулбами синдром80 %

4. Епилепсија са учесталим нападима и карактерним променама личности70 %

5. Дифузне повреде мозга са клинички евидентираним последицама психоорганског синдрома:

- а) у лакој степену до40 %
- б) у средњем степену50 %
- в) у јакој степену60 %

6. Хемипарезе или дисфазија:

- а) у лакој степену30 %
- б) у средњем степену40 %
- в) у јакој степену50 %

7. Оштећење малог мозга са адиодохокинезом и асинерегијом.....40 %

8. Епилепсија са ретким нападима 20 до 30 %

9. Контузионе повреде мозга:

- а) постконтузиони синдром уз постојање објективног неуролошког налаза после болнички утврђене контузије мозга20 %
- б) оперисани интрацеребрални хематом без неуролошког испада20 %

10. Стање после трепанације свода лобање и/или лома базе лобање, рентгенолошки верифицирано10 %

11. Посткомозионални синдром после болнички односно медицински утврђене трауме мозга без постојања објективно неуролошког налаза до...10 %

Посебни услови:

1. За потресе мозга који нису болнички или медицински утврђени не одређује се трајна здравствена неспособност.
2. Сви облици епилепсије морају бити болнички утврђени уз примјену савремених дијагностичких метода.

За све случајеве из ове главе здравствена неспособност се одређује најраније 10 месеци после несрећног случаја.

12. Скалпирање власишта код мушкараца:

- а) трећина површине власишта5 %
- б) половина површине власишта 15 %
- в) читаво власиште30 %

13. Скалпирање власишта код жене:

- а) трећина површине власишта10 %

- б) половина површине власишта20 %
- в) читаво власиште40 %

II ОЧИ

14. Потпуни губитак вида на оба ока100 %

15. Потпуни губитак вида на једно око33 %

16. Ослабљење вида једног ока - за сваку десетину смањења.....3,33 %

17. У случају да је на другом оку вид ослабио за више од 3 десетине, за сваку десетину смањења вида повређеног ока одређује се.....6,66 %

18. Диплопија као трајна и репаративна последица повреде ока до20 %

19. Губитак очног сочива:

- а) афакија једнострани20 %
- б) афакија обострани30 %

20. Делимична оштећења мрежњаче и стакластог тела:

- а) делимични испад видног поља као последица посттрауматске аблације ретине5 %
- б) опациталес корпорис витреи као последица трауматског крварења у стакластом телу ока ...5 %

21. Мидријаза као последица директне трауме ока 5%

22. Непотпуна унутрашња офталмоплексија10 %

23. Повреде сузног апарата и очних капака:

- а) епифора5 %
- б) ентропиум, ектропиум5 %
- в) птоза капка5 %

24. Концентрично сужење видног поља на преосталом оку:

- а) до 60 степени10 %
- б) до 40 степени30 %
- в) до 20 степени50 %
- д) до 5 степени60 %

25. Једнострано концентрично сужење видног поља:

- а) до 50 степени5 %
- б) до 30 степени 15 %
- в) до 5 степени30 %

26. Хомонимна хемијанопсија30 %

III УШИ

27. Потпуна глувоћа на оба уха са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа.....40 %

28. Потпуна глувоћа на оба уха са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа ...60 %

29. Ослабљен вестибуларни орган са уредним слухом5 %

30. Потпуна глувоћа на једном уху:

- а) са уредном калоричком реакцијом вестибуларног органа..... 15 %
- б) са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа на том уху.....20 %

31. Обострана наглувост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Фоввлер- Сабине:

- а) 20 до 30 %.....5 %
- б) 31 до 60 %.....10 %
- в) 61 до 85 %20 %

32. Обострана наглувост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Фоввлер- Сабине:

- а) 20 до 30 %.....10 %
- б) 31 до 60 %.....20 %
- в) 61 до 85 %.....30 %

33. Једнострани тешка наглувост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела10 %

34. Једнострани тешка наглувост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела2,5 %

35. Повреда ушне шкољке:

- а) делимичан губитак или делимична деформација5 %
- б) потпуни губитак или потпуна деформација ...10 %

IV ЛИЦЕ

36. Ожиљно деформирајућа оштећења на лицу праћена функционалним сметњама и/или посттрауматска повреда лица:

- а) у лакој степену.....5 %
- б) у средњем степену.....10 %
- в) у јакој степену..... 25 %

Посебни услови:

За козметичке и естетске ожиљке или друге промене на лицу не одређује се трајна здравствена неспособност.

37. Ограничено отварање уста:

- а) размак горњих и доњих зуба до 4 цм.....5 %
- б) размак горњих и доњих зуба до 3 цм..... 15 %
- в) размак горњих и доњих зуба до 1,5 цм.....30 %

38. Дефекти на чељусном скелету, на језику или непу са функционалним сметњама:

- а) у лакој степену.....10 %
- б) у средњем степену.....20 %
- в) у јакој степену.....30 %

За случајеве под тачкама 36., 37. и 38. нарушење здравља се одређује после завршеног лечења, али не раније од 6 месеци после повреде.

39. Губитак сталних зуба:

- а) од 16 за сваки зуб1 %
- б) од 17 или више за сваки зуб1,5 %

40. Пареза фацијалног живца после фрактуре слепоочне кости или повреде одговарајуће паротидне регије:

- а) у лакој степену до10 %
- б) у средњем степену15 %
- в) у јакој степену са контрактуром и тиком мимичке мускулатуре.....20 %
- д) парализа фацијалног живца30 %

Трајна здравствена неспособност се одређује после завршеног лечења али не раније од 1 године после повреде.

V НОС

41. Повреде носа:

- а) губитак чула мириса.....10 %
- б) делимичан губитак носа до 15 %
- в) губитак читавог носа30 %

42. Аносмија као последица верифициране фрактуре горњег унутрашњег дела носног скелета5 %

43. Промена облика пирамиде носа:

- а) у лакој степену до10 %
- б) у средњем степену 15 %
- в) у јакој степену20 %

44. Отежано дисање услед фрактуре носног септума, која мора бити утврђена клинички и рентгенолошки непосредно после повреде.....5 %

VI ДУШНИК И ЈЕДЊАК

45. Повреде душника:

- а) стање после трахеотомије код виталних индикација после повреде.....5 %
- б) губитак чула укуса5 %
- в) стенозе душника после повреде гркљана и почетног дела душника10 %

46. Стеноза душника, због које осигураник мора трајно носити канилу.....60 %

47. Трајна органска промуклост због повреде:

- а) слабијег интензитета..... 5 %
- б) јачег интензитета..... 15 %
- в) потпуни губитак гласа30 %

48. Сужење једњака:

- а) лакој степену.....10 %
- б) у средњем степену.....20 %
- в) у јакој степену.....30 %

49. Потпуно сужење једњака са гастростомом...80 %

VII ГРУДНИ КОШ

50. Прелом од најмање два ребра, ако је зацељен са дислокацијом или прелом стернума ако је зацељен са дислокацијом до10 %

51. Оперативни ожиљак после отварања грудне шупљине до10 %

52. Смањење плућне функције услед серијског прелома ребара или пенетрантних повреда грудног коша, посттрауматских атхезија или услед рестриктивних сметњи:

- а) за 20 до 30 %..... 15 %
- б) за 31 до 50 %.....30 %
- в) за 51 или више %45 %

53. Фистула након емпиема..... 15 %

54. Хронични плућни апсцес.....30 %

Посебни услови:

1. Капацитет плућа се одређује поновљеном спирометријом, а по потреби и детаљном пулмолошком обрадом и ергометријом.

2. Ако су стања из тачке 50., 51., 53. и 54. праћена поремећајем плућне функције рестриктивног типа, онда се не цене по наведеним тачкама, већ по тачки 52.

55. Губитак једне дојке:

- а) до 50 година живота10 %
- б) преко 50 година живота5 %
- в) тешко оштећење дојке до 50 година живота.....5 %

56. Губитак обе дојке:

- а) до 50 година живота30 %
- б) преко 50 година живота 15 %
- в) тешко оштећење дојке до 50 година живот ...10 %

57. Последице пенетрантних повреда срца и великих крвних судова грудног коша:

- а) срце са нормалним електрокардиограмом...30 %
- б) са промењеним електрокардиограмом према тежини промене до60 %
- в) крвни судови 15 %
- д) анеуризма аорте са имплантатом.....40 %

58. Дубљи ожиљци на телу после опекотина или повреда без сметњи мотилитета а захватају:

- а) до 10 % површине тела до.....10 %
 б) преко 10 % површине тела до20 %

59. Дубоки ожиљци на телу после опекотина или повреда, а захватају:

- а) до 10 % површине тела до.....10 %
 б) до 20 % површине тела до20 %
 в) преко 20 % површине тела30 %

Посебни услови:

1. Случајеви из тачке 58. и 59. израчунавају се применом правила деветке.
2. Функционалне сметње изазване опекотинама или повредама из тачке 59. оцјењују се и према одговарајућим тачкама из Табеле.

VIII ТРБУШНИ ОРГАНИ

60. Трауматска хернија - верификована у болници или здравственој установи непосредно после повреде, ако је истовремено била поред херније клинички верификована повреда меких делова трбушног зида у том подручју10 %

61. Повреде дијафрагме:

- а) стање након прскања дијафрагме у болници непосредно после повреде верификовано и хируршки збринута 20 %
 б) дијафрагмална хернија - рецидив након хируршки збринуте дијафрагмалне трауматске киле30 %

62. Постоперативна хернија после лапаратомије до20 %

63. Оперативни ожиљак после лапаратомије.....5 %

64. Повреда црева и/или јетре, слезине, желуца:

- а) са шивењем..... 15 %
 б) повреда црева и/или желуца са ресекцијом20 %
 в) повреда јетре са ресекцијом.....30 %

65. Губитак слезине (Спленцетомиа):

- а) до 20 година живота25 %
 б) преко 20 година живота20 %

66. Повреда гуштераче према функционалном оштећењу до20 %

67. Анус праернатуралис:

- а) танког црева60 %
 б) дебелог црева50 %

68. Фистула стерцоралис40 %

69. Трајни пролапсус ректи20 %

70. Инконтиненција алви:

- а) Делимична до50 %
 б) потпуна80 %

IX МОКРАЋНИ ОРГАНИ

71. Губитак једног бубрега - уз нормалну функцију другог30 %

72. Губитак једног бубрега уз оштећење функције другог:

- а) у лакој степену до 30 % оштећења функције40 %
 б) у средњем степену до 50 % оштећења функције 55 %
 в) у јакој степену преко 50 % оштећења функције до80 %

73. Функционална оштећења једног бубрега:

- а) у лакој степену до 50 % оштећења функције 15 %
 б) у јакој степену преко 50 % оштећења функције 20 %

74. Функционалне Последице оштећења оба бубрега:

- а) у лакој степену.....30 %
 б) у јакој степену60 %

75. Поремећај испуштања мокраће услед повреде уретре, градулирано по Цхавиер-у:

- а) у лакој степену испод 18 цх10 %
 б) у средњем степену испод 14 цх20 %
 в) у јакој степену испод 6 цх35 %

76. Потпуна инконтиненција урина:

- а) код мушкарца50 %
- б) код жене70 %

77. Уринарна фистула:

- а) уретрална20 %
- б) перинеална или вагинална40 %

78. Повреда мокраћног мехура са смањеним капацитетом за сваку 1/3 смањења капацитета10 %

X МУШКИ И ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

79. Губитак једног тестиса до 60 година живота 15 %

80. Губитак једног тестиса преко 60 година живота5 %

81. Губитак оба тестиса:

- а) до 60 година живота50 %
- б) преко 60 година живота30 %

82. Губитак пениса до 60 година живота50 %

83. Губитак пениса преко 60 година живота30 %

84. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом до 60 година живота.....50 %

85. Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом преко 60 година живота30 %

86. Губитак материце и јајника до 55 година живота:

- а) губитак материце30 %
- б) за губитак једног јајника10 %
- в) за губитак оба јајника30 %

87. Губитак материце и јајника преко 55 година живота:

- а) губитак материце10 %
- б) за губитак сваког јајника5 %

88. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију до 60 година живота50 %

89. Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију преко 60 година живота 15 %

XI КИЧМА

90. Повреда кичме са трајним оштећењем моздине, или периферног нервног система (тетраплегија, триплегија, параплегија) са губитком контроле дефекације и уринирања100 %

91. Повреда кичме са трајним оштећењем моздине или периферног нервног система (тетрапареза, трипареза) са очуваном контролом дефекације и уринирања90 %

92. Повреда кичме са потпуном парализом доњих екстремитета без сметњи дефекације и уринирања 90 %

93. Повреда кичме са парезом доњих екстремитета:

- а) у лакој степену до30 %
- б) у средњем степену40 %
- в) у јакој степену50 %

94. Смањена покретљивост кичме услед прелома најмање два пршљена уз промену кривуље кичме (кифоза, гибус, сколиоза):

- а) у лакој степену до20 %
- б) у средњем степену30 %
- в) у јакој степену40 %

95. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела цервикалног сегмента:

- а) у лакој степену до10 %
- б) у средњем степену20 %
- в) у јакој степену30 %

96. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела торакаралног сегмента:

- а) у лакој степену5 %
- б) у средњем степену10 %
- в) у јакој степену20 %

97. Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела лумбалног сегмента:

- а) у лакој степену до15 %
- б) у средњем степену25 %

в) у јаком степену35 %

98. Серијски прелом 3 или више спиналних наставака кичме..... 5 %

99. Серијски прелом 3 или више попречних наставака кичме до10 %

Посебни услови:

Херниа дисци интервертебралис, све врсте лумбагија, дископатија, спондилоза, спондилолистеза, спондилолиза, сакралгија миофасцитиса, кокцигодинаија, исхиалгија, фиброзитиса, фасцитиса и све патоанатомске промене слабинско крстне регије означене аналогним терминима, нису обухваћене осигурањем.

XII КАРЛИЦА

100. Вишеструки прелом карлице уз тежу деформацију или денивелацију сакроилијакалних зглобова или симфизе30 %

101. Симфизеолза са дислокацијом хоризонталном и/или вертикалном:

- а) величине 1 цм10 %
- б) величине 2цм 15 %
- в) величине преко 2цм25 %

102. Прелом једне цревне кости саниран уз дислокацију10 %

103. Прелом обе цревне кости саниран уз дислокацију 15 %

104. Прелом седне или стидне кости саниран уз дислокацију10 %

105. Паралелни прелом двије стидне или седне кости саниран уз дислокацију 15 %

106. Прелом крстачне кости саниран уз дислокацију 15 %

107. Трвична кост:

- а) прелом трвичне кости саниран са дислокацијом, или оперативно одстрањен одломљени фрагмент5 %
- б) оперативно одстрањена трвична кост10 %

Посебни услови:

За преломе костију карлице који су санирани без дислокације и без објективних функционалних сметњи не одређује се трајна здравствена неспособност.

XIII РУКЕ

108. Губитак обе руке или шаке100 %

109. Губитак руке у рамену (ексарткулација)... 70 %

110. Губитак руке у подручју надлактице65 %

111. Губитак руке испод лакта са очуваном функцијом лакта60 %

112. Губитак шаке55 %

113. Губитак свих прстију на обе шаке90 %

114. Губитак палца20 %

115. Губитак кажипрста 12 %

116. Губитак средњег, домалог и малог прста:

- а) средњег9 %
- б) домалог или малог, за сваки прст6 %

117. Губитак метакарпалне кости палца6 %

118. Губитак метакарпалне кости кажипрста4 %

119. Губитак метакарпалне кости средњег, домалог или малог прста, за сваку3 %

Посебни услови:

За губитак једног чланка палца одређује се половина, а за губитак једног чланка осталих прстију одређује се трећина процента одређеног за дотични прст.

За губитак јагодице прста одређује се 1/2 процента одређеног за губитак чланка.

Делимичан губитак коштаног дела чланка, оцењује се као потпуни губитак чланка.

XIV НАДЛАКТИЦА

120. Анкилоза раменог зглоба у функционално неповољном положају (абдукција)35 %

121. Анкилоза раменог зглоба у функционално повољном положају (абдукција)25 %
122. Умањена покретљивост руке у раменом зглобу:
- а) у лаком степену до10 %
 б) у средњем степену20 %
 ц) јаком степену30 %
123. Хабитално ишчашење раменог зглоба које се верифицирано често јавља20 %
124. Лабавост раменог зглоба са коштаном дефектом зглобних тела35 %
125. Кључна кост:
- а) неправилно зарастао прелом кључне кости ...5 %
 б) псеудоартроза кључне кости10 %
126. Делимично ишчашење (сублуксација) акромиокла-викуларног или стерноклавикуларног зглоба без умањене покретљивости5 %
127. Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба10 %
128. Ендопротеза раменог зглоба30 %
129. Псеудоартроза надлактичне кости30 %
130. Хронични остеомиелитис костију горњих екстремитета са фистулом10 %
131. Парализа живца ацесориуса 15 %
132. Парализа брахијалног плексуса 60 %
133. Делимична парализа брахијалног плексуса (Ерб или Клумпке).....35 %
134. Парализа аксиларног живца 15 %
135. Парализа радијалног живца30 %
136. Парализа живца медиануса35 %
137. Парализа живца улнариса30 %
138. Парализа два живца једне руке50 %
139. Парализа три живца једне руке60 %

Посебни услови:

За парезу живаца одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве који спадају под тачке 131. до 139. одређује се трајна здравствена неспособност завршеног лечења, али не пре 2 године после незгоде.

XV ПОДЛАКТИЦА

140. Анкилоза зглоба лакта у функционално повољном положају од 100 до 14020 %
141. Анкилоза зглоба лакта у функционално неповољном положају30 %
142. Умањена покретљивост зглоба лакта:
- а) у лаком степену до10 %
 б) у средњем степену 15 %
 в) у јаком степену20 %
143. Расклимани зглоб лакта:
- а) у лаком степену до10 %
 б) у средњем степену20 %
 в) у јаком степену30 %
144. Ендопротеза лакта25 %
145. Псеудоартроза обе кости подлактице30 %
146. Псеудоартроза радиуса 15 %
147. Псеудоартроза улне 15 %
148. Анкилоза подлактице у супинацији25 %
149. Анкилоза подлактице у средњем положају 15 %
150. Анкилоза подлактице у пронацији20 %
151. Умањена пронација и супинација подлактице:
- а) у лаком степену5 %
 б) у средњем степену10 %
 в) у јаком степену 15 %
152. Анкилоза ручног зглоба:

- а) у дорзалној екстензији 15 %
- б) у продужењу осовине подлактице20 %
- в) у воларној флексији30 %

153. Умањена покретљивост ручног зглоба:

- а) у лакром степену до10 %
- б) у средњем степену 15 %
- в) у јаком степену20 %

154. Ендопротеза чунасте кости и/или лунарне кости20 %

155. Ендопротеза ручног зглоба25 %

Посебни услови:

Псеудоартроза чунасте и/или лунарне кости се оцењује према тачки 153.

XVI ПРСТИ

156. Анкилоза свих прстију једне руке40 %

157. Анкилоза читавог палца 15 %

158. Анкилоза читавог кажипрста9 %

159. Потпуна укоченост средњег, домалог и малог прста:

- а) читавог средњег прста6 %
- б) домалог или малог прста, за сваки4 %

Посебни услови:

1. За потпуну укоченост једног зглоба палца одређује се 1/2, а за потпуну укоченост једног зглоба осталих прстију одређује се 1/3 процента одређеног за губитак тог прста.

2. Збир процената за угроженост појединих зглобова једног прста не може бити већи од процента одређеног за потпуну укоченост тог прста.

160. Умањена покретљивост палца после уредно зацељеног Бенетовог прелома5 %

161. Неправилно зацељен Бенетов прелом палца10 %

162. Прелом метакарпалних костију:

- а) неправилно зарастао прелом метакарпалних кости4 %

б) за остале метакарпалне кости II, III, IV и V-е за сваку кост3 %

163. Умањена покретљивост дисталног или базалног зглоба палца:

- а) у лакром степену3 %
- б) у јаком степену6 %

164. Умањена покретљивост појединих зглобова кажипрста:

- а) у лакром степену за сваки зглоб2 %
- б) у средњем степену за сваки зглоб3 %
- в) у јаком степену за сваки зглоб4 %

165. Умањена покретљивост појединих зглобова:

А) средњег прста:

- а) у лакром степену за сваки зглоб1,5 %
- б) у средњем степену за сваки зглоб2 %
- в) у јаком степену за сваки зглоб3 %

Б) домалог или малог прста:

- а) у лакром степену за сваки зглоб1 %
- б) у средњем степену за сваки зглоб2 %
- в) у јаком степену за сваки зглоб3 %

Посебни услови:

За различите последице на истом зглобу не сабирају се проценти по појединим тачкама, а трајна здравствена неспособност се одређује само по оној тачки која одређује највећи проценат. Укупан проценат трајне здравствене неспособности по тачки 163., 164. и 165. не може износити више од процента за потпуну анкилозу дотичног прста.

XVII НОГА

166. Губитак обе надколенице100 %

167. Ексартикулација ноге у куку70 %

168. Губитак надколенице у горњој трећини, ако је батрљак неподесан за протезу60 %

169. Губитак надколенице испод горње трећине50 %

170. Губитак обе подколенице, ако су батрљци подешени за протезу80 %

171. Губитак подколенице, батрљак испод 6 цм	50 %
172. Губитак подколенице, батрљак преко 6 цм	40 %
173. Губитак оба стопала	80 %
174. Губитак једног стопала	35 %
175. Губитак стопала у Цхопартовој линији	35 %
176. Губитак стопала у Лисфранцовој линији	30 %
177. Трансметатарзална ампутација	25 %
178. Губитак I или V метатарзалне кости	5 %
179. Губитак II, III, IV метатарзалне кости-за сваку	3 %
180. Губитак свих прстију стопала на једној ноzi	20 %
181. Губитак палца на стопалу:	
а) губитак крајњег чланка палца	5 %
б) губитак целог палца	10 %
182. Губитак читавог II-V прста на ноzi-за сваки прст	2,5 %
183. Делимични губитак II-V прста на ноzi -за сваки прст	1 %

Посебни услови:

Укоченост ининтерфалангеалних зглобова II-V прста у испруженом положају или умањена покретљивост ових зглобова не представља нарушење здравља.

XVIII БЕДРО

184. Анкилоза кука у функционално повољном положају	30 %
185. Анкилоза кука у функционално неповољном положају	40 %
186. Анкилоза оба кука	70 %
187. Нерепонирано застарело ишчашење кука	40 %

188. Псеудоартроза врата бедрене кости са
скраћењем ноге
 45 % |

189. Деформирајућа артроза кука уз смањену
покретљивост кука:

а) у лакој степену до	15 %
б) у средњем степену	25 %
ц) у јакој степену	35 %

190. Ендопротеза кука
 30 % |

191. Умањена покретљивост кука без знакова
деформирајуће артрозе:

а) у лакој степену до	10 %
б) у средњем степену	15 %
в) у јакој степену	25 %

192. Псеудоартроза бедрене кости
 40 % |

193. Неправилно зацељен прелом бедрене кости уз
ангулацију за:

а) 10 до 20 степени до	10 %
б) преко 20 степени	15 %

194. Хронични остеомиелитис са фистулом
 10 % |

195. Велики дубоки ожигљци у мишићима
надколенице или подколенице, као и трауматске
херније мишића надколенице и подколенице, без
поремећаја функције зглоба до
 10 % |

196. Циркулаторне промене после оштећења
великих крвних судова доњих екстремитета:

а) подколенице до	10 %
б) надколенице до	20 %

197. Скраћење ноге због прелома:

а) за 2 до 4 цм до	10 %
б) за 4,1 до 6 цм	15 %
в) преко 6 цм	20 %

XIX ПОДКОЛЕНИЦА

198. Анкилоза колена:

а) у функционално повољном положају до 10 степени флексије25 %

б) у функционално неповољном положају35 %

199. Деформирајућа артроза колена после повреде зглобних тела уз умањену покретљивост са рентгенолошком верификацијом:

а) у лакој степену од 91 до 135 степени до 15 %

б) у средњем степену од 46 до 90 степени25 %

в) у јакој степену од 0 до 45 степени35 %

200. Умањена покретљивост зглоба колена:

а) у лакој степену од 91 до 135 степени до10 %

б) у средњем степену од 46 до 90 степени 15 %

ц) у јакој степену од 0 до 45 степени20 %

201. Умањена флексија колена за мање од 15 степени 5 %

202. Расклиманост колена после повреда капсуле или лигаментарног апарата, поређена са здравим коленом:

а) лабавост у једном правцу до10 %

б) лабавост у два правца 15 %

в) стално ношење ортопедског апарата30 %

203. Оштећење менискуса са рецидивирајућим сметњама или стање после оперативног одстрањења менискуса5 %

204. Ендопротеза колена30 %

205. Слободно зглобно тијело до10 %

206. Функционалне сметње после одстрањења пателе:

а) парцијално одстрањена патела5 %

б) тотално одстрањена патела 15 %

207. Псеудоартроза пателе10 %

208. Рецидивирајући трауматски синовитис колена и/или трауматска цхондромалација пателе10 %

209. Псеудоартроза тибие30 %

210. Неправилно зацељен прелом подколенице уз валгус, варус или рекурватус деформацију:

а) за 5 до 15 степени10 %

б) преко 15 степени20 %

211. Анкилоза скочног зглоба у функционално повољном положају (5 до 10 степени плантарне флексије)20 %

212. Анкилоза скочног зглоба у функционално неповољном положају.....25 %

213. Умањена покретљивост скочног зглоба:

а) у лакој степену до10 %

б) у средњем степену..... 15 %

в) у јакој степену20 %

214. Умањена покретљивост стопала у једном правцу за мање од 10 степени5 %

215. Ендопротеза скочног зглоба25 %

216. Неправилно зацељен прелом малеола уз проширење малеола ме виљушке20 %

217. Деформација стопала: пес еихцаватус, пес плановалгус, пес еруинус, пес варус:

а) у лакој степену до10 %

б) у јакој степену20 %

218. Деформација цалцанеуса после компресивног прелома до20 %

219. Деформација талуса после прелома уз деформирајућу артрозу до20 %

220. Изолирани преломи тарзалних костију без веће деформације5 %

221. Деформација једне метатарзалне кости после прелома за сваку (укупно не више од 10 %)3 %

222. Већа деформација метатарзуса после прелома метатарзалних костију до ...10 %

223. Анкилоза крајњег зглоба палца на нози ..2,5 %

224. Анкилоза основног или оба зглоба палца на нози 5 %

225. Анкилоза основног зглоба II-V прста - за сваки прст1 %

226. Деформација или анкилоза II-V прста - у савијеном положају (дигитус флехус) - за сваки прст1,5 %

227. Велики ожигљци на пети или табану после дефекта неких тела:

а) површина до 1/2 табана до10 %

б) површина преко 1/2 табана до20 %

228. Парализа исхијадичког живца40 %

229. Парализа феморалног живца30 %

230. Парализа тибијалног живца25 %

231. Парализа перонеалног живца25 %

232. Парализа глуедалног живца10 %

Посебни услови:

За парезу живаца на нози одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве наведене у тачкама 228. до 232. одређује се трајна здравствена неспособност после завршеног лечења, али не раније од 2 године после повреде.

ПРОЦЕНА ОПЕЧЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО WALLACE-овом ПРАВИЛУ

Правило деветке:

- врат и глава9 %
- једна рука9 %
- предња страна трупа 2 x 9 %
- задња страна трупа2 x 9 %
- нога 2 x 9 %
- перинеум и гениталије.....1 %

53020.02/58